


BASDAI
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
in Chinese language

姓名_____ 病歷號_____ 日期_____年_____月_____日

BASDAI 活性量表：過去一週內，這些問題的嚴重程度，在每一條線上標上 **X** 記號：


❶ 疲累的感覺

完全沒有  非常嚴重

❷ 脊椎（包含頸部、背部及髖關節）疼痛程度

完全沒有  非常嚴重


❸ 其他（頸部、背部及髖關節以外）關節疼痛程度

完全沒有  非常嚴重

❹ 身體任何部位有觸痛或壓痛的不適程度

完全沒有  非常嚴重

❺ 早上起床晨間僵硬程度

完全沒有  非常嚴重

❻ 從起床開始計算，您的晨間僵硬時間

完全沒有  非常嚴重

0 0.5 1 1.5 2 小時

僵直性脊椎炎臨床評估計算方法

此項目共有六個問題。當受測者完成試測項目，並經測試者的再次確認後量化。方法為：

(1)量出受測者在答題線上的長度。並分別記錄在 BASDAI 的欄位（❶～❻）

(2)算出這六個問題的平均值並記錄在 BASDAI 欄位上：

$$\left(\text{❶} + \text{❷} + \text{❸} + \text{❹} + \frac{\text{❺} + \text{❻}}{2} \right) / 5 = \text{BASDAI}$$